

ORIENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA REALIZADA À TARDE

Alimentação:

- Até 06h00, pode tomar 1 copo de chá + 3 bolachas de água e sal.
- Após 06h00, JEJUM ABSOLUTO (não tomar nem água).

No dia do exame:

- Vir com acompanhante.
- Não é permitido dirigir após exame com sedação.
- Medicamentos de rotina (hipertensão) devem ser tomados com 20 ml de água, mesmo estando em jejum.

Medicamentos anticoagulantes => SUSPENDER:

- * AAS => por 7 dias.
- * Heparina e Clexane => por 24 horas.

ATENÇÃO! Durante a endoscopia, pode ser necessária a coleta de material para biópsia. Por isso, caso o paciente não tenha interrompido o uso de anticoagulantes, o exame não será realizado.

Reações adversas dos medicamentos utilizados durante o exame:

- Dimeticona (luftal) - para gases - sem efeito colateral.
- Midazolam (dormonid) - utilizado a critério médico para sedação; durante período de 8 a 10 horas, diminui o reflexo e o raciocínio, podendo ocorrer hipotensão (pressão baixa), tontura, sonolência, diminuição do ritmo respiratório e ansiedade.
- Xylocaína spray - o anestésico é aplicado na garganta para diminuir o desconforto da passagem do endoscópio e seu efeito é de aproximadamente 30 minutos, podendo causar reação alérgica para pacientes sensíveis ao medicamento.

DATA DO EXAME: ____/____/____ **HORÁRIO:** _____

Local: Bloco 3 - Serviço de Diagnóstico

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo ramal 3539.