



Hospital Estadual Bauru  
Av. Eng. Luís Edmundo C. Coube, 1-100  
CEP: 17.033-360 Bauru/SP  
Telefone: (14) 3103-7777

## ORIENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA PROCEDIMENTO NASOFIBROSCOPIA E TELESCOPIA

NO DIA DO EXAME	
Nasolaringoscopia e Telescopia (2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> feira)	Nasolaringoscopia e Telescopia (DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO)
JEJUM DE 2 HORAS ANTES DO EXAME	JEJUM DE 5 HORAS ANTES DO EXAME, devido à coleta de biópsia.

- Apenas crianças devem vir com acompanhante. Para adultos, não é necessário.
- Medicamentos de rotina (principalmente para hipertensão) devem ser tomados.
- Evitar colocar medicamentos de uso nasal.

### Medicamentos anticoagulantes => SUSPENDER:

- \* AAS, Gingko Biloba, Aspirina, Melhoral e todos os medicamentos à base de ácido acetilsalicílico => por 7 dias.
- \* Heparina e Clexane => por 24 horas.

**ATENÇÃO! Durante a nasolaringoscopia ou a telescopia,  
pode ser necessária a coleta de material para biópsia.  
Por isso, caso o paciente não tenha interrompido o uso  
de anticoagulantes, o exame não será realizado.**

Reações adversas dos medicamentos utilizados durante o exame:

- Lidocaína a 2% - anestesia local, spray nasal - é aplicado nas narinas para diminuir o desconforto da passagem do endoscópio e seu efeito é de aproximadamente 30 minutos, podendo causar reação alérgica para pacientes sensíveis ao medicamento.
- Nafazolina gotas - utilizada como descongestionante nasal - podem ocorrer irritações da mucosa nasal, em pacientes sensíveis ao medicamento.

DATA DO EXAME: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ HORÁRIO: \_\_\_\_\_  
Local: Bloco 3 - Serviço de Diagnóstico  
Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo ramal 3539.